

Frågor om Praluent® förfylld penna:

www.medicininstruktioner.se

www.fass.se

08-634 50 00

Läs bipacksedeln noggrant.

PRALUENT® (alirokumab), (F), Rx, C10AX14, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. **Indikation:** Praluent är indicerat hos vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär samt icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet; i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som ej når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos eller, ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statintoleranta, eller när statinbehandling är kontraindicerad. **Varningar och försiktighet:** Praluent ska användas med försiktighet till patienter med gravt nedsatt njur- och leverfunktion. Effekten av Praluent på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu inte fastställts. För ytterligare information: se www.fass.se. **Kontaktuppgifter:** PRALUENT tillhandahålls av Sanofi AB, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com, 08-6345000. Datum för senaste översyn av produktresumé: november 2016.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


Praluent®
alirokumab

SASE:AL117.02.0076a | MARS 2017


Patientinformation

Till dig som behandlas med Praluent®




Praluent®
alirokumab


Förbered injektionsstället



Ta fram pennan
30 min innan




Alkoholservett




Bomullstuss


- Du kan injicera på lår, överarm eller mage (mer än 5 cm från naveln).
- Tvätta händerna med tvål och vatten och rengör sedan huden på injektionsområdet med en alkoholservett.
- Injicera ej i hud som är öm, hård, röd eller varm.
- Injicera ej i område nära en synlig ven.
- Undvik att sticka dig på exakt samma ställe varje gång.




Utför injektion




1 Dra av den blå skyddshylsan.




2 Håll pennan som på bilden.



3 Kläm ihop huden (gäller ej överarm) vid injektionsstället.
Håll pennan mot huden i 90° vinkel, med fönstret mot dig, med ett lätt tryck så att det gula nålskyddet ej syns.




4 Tryck ned den blå knappen med tummen och släpp sedan upp den omedelbart.
Du hör ett klickljud, injektionen startar.




5 Håll kvar pennan mot huden. Fönstret på pennan ska bli helt gult. Injektionen kan ta upp till 20 sekunder.

När du hör ett andra klickljud är injektionen klar. Om detta skulle utebli, räkna till 10 och kontrollera att fönstret är helt gult innan du tar bort pennan.



6 Gnid inte huden efter injektion. Tryck vid behov en bomullstuss mot injektionsstället.



7 Släng pennan i avsedd behållare.

Glöm inte att notera i dagboken!



Snabbguide

- Ta fram pennan och lägg i rumstemperatur i 30 min.
- Tvätta händerna och sätt dig bekvämt.
- Rengör injektionsstället med en alkoholservett.
- Tryck den förfyllda pennan mot huden för att säkerställa att du hamnar i en bra och bekväm position. Håll pennan så att fönstret är riktat mot dig.
- Utför injektionen.

Tips


Påminnelse att du ska ta din injektion:

- Notera i t.ex. almanacka eller som påminnelse i telefon eller surfplatta.
- Starta Praluent timer.
- Planera i god tid hur du ska sköta din Praluent® medicineri i samband med resa, tala med din läkare hur du bäst gör detta.
- Om ej injektionen fullföljs, kontakta sjukvården för råd.

Allmän information

- Läkemedlet ska injiceras varannan eller var fjärde vecka vid ungefär samma tid.
- Missad dos:
 - Inom 7 dagar, ta injektionen.
 - Om mer än 7 dagar, hoppa över injektionen och återuppta behandling två veckor efter dagen för den missade dosen.
- Förvara pennan i kylskåp (2°C till 8°C). Praluent kan förvaras utanför kylskåp (vid högst 25°C) skyddat från ljus under en sammanhängande period av högst 30 dagar.
- Efter att läkemedlet tagits ut från kylskåpet måste det användas inom 30 dagar eller kasseras.
- Förvara pennan i ytterförpackningen, pennan är ljuskänslig. Utsätt ej pennan för hög värme (över 25°C) eller frysgrader.
- Om du ser luftbubblor större än 0,5 cm i injektorfönstret eller om injektorfönstret är sprucket - använd ej pennan!
- Om pennan ej hanteras enligt ovan - använd ej!

Praluent® förfylld penna



Innan du tar injektionen

1. Låt pennan bli varm i rumstemperatur 30 minuter. Rumstemperaturen ska vara 18-25 °C.
2. Tvätta händerna med tvål och vatten.
3. Kontrollera utgångsdatum, använd ej om datum gått ut.
4. Titta i pennfönstret, om det är GULT använd EJ.

